



Botanische naam	Cucurbita moschata
Ras/soort/cv/synoniem	Muskaatpompoen 'Charles Naudin', Courge musquée 'Charles Naudin'
Nummer	016
Beschrijving, origine, historiek	<p>Deze muskaatpompoen werd rond 1892 op de markt gebracht door het befaamd Napolitaans Zaadhuis Ernesto Dammann &amp; Co en werd genoemd naar de franse cucurbitoloog <b>Charles Naudin</b> (1815-1899)</p> <p><i>'Deze variëteit heeft zeer mooie ronde witte vruchten met groene strepen. De zaden zijn groot en zilverachtig grijs van kleur. Hier in Napels zijn ze erg in trek als lekkernij. De bloemen worden in eigeel gedompeld en vervolgens gefrituurd...'</i></p> <p><i>'Plante ornementale qui fournit en même temps un excellent légume. Elle ne grimpe que très peu et a de grandes feuilles tachetées et de grandes fleurs jaune d'or. Ses fruits sont ronds, blancs striés de vert, d'une chair très blanche et à grosses graines blanches argentées. Les fruits se produisent en grand nombre et une fois mûrs et endurcis, ils se conservent très longtemps'</i></p> <p>Uit Catalogus Ernesto Dammann &amp; Co., cultivateurs à San Giovanni a Teduccio près de Naples—anno 1897-1900</p> <p>Aan de beschrijving van de zaden--en ook door het feit dat ze als lekkernij werden genuttigd--zou dit ras nu als een Cucurbita argyrosperma (syn.Cucurbita mixta) beschouwd worden.</p>



No. 3. Speisekürbis „Charles Naudin“ (Cucurbita moschata).  
Früchte weiss, grün gezeichnet.  
Cource à manger. Fruits blancs et verts.  
Cliché Fr. 4.—  
(Siehe Seite 22. — voir à page 22.)

**Charles Naudin** (1815-1899) werd geboren in het frans dorpje Autun (Dijon). Als botanist was hij werkzaam aan het 'Museum d'Histoire Naturelle' te Parijs.

Hij bestudeerde gedurende drie jaar meer dan 1200 pompoenrassen (allemaal cucurbita vruchten) en legde in zijn publikatie



'*Nouvelles recherches sur les caractères spécifique et les variétés des plantes du genre Cucurbita*', als eerste een verband tussen de drie hoofdsorten --Cucurbita maxima, Cucurbita pepo en Cucurbita moschata.

Aan de vorm van de bladeren en de 'steelplanting' van de vruchten kon hij ze thuisbrengen in één van deze drie hoofdsorten.

Periode aanbod	Na 15-20 jaar uit circulatie.
Geboortjaar	Pre-1892
Alternatief/ verwante rassen,soorten	Talrijke rassen die tot 'Cucurbita mixta' behoren zoals 'Striped Cushaw' 'Veracruz pepita' 'Silver Edged'
Bronvermelding	* Zadencatalogus E.Dammann & Co (I)—anno 1897- * "Annales des Sciences Naturelles -Botanique tome VI" -Paris-(F)- 1856-
Waar te vinden ?	